1. 熱中症の症状

高温・多湿・風が弱い環境で次の症状があったら要注意

めまい

立ちくらみ

生あくび

大量の発汗

筋肉痛

こむら返り

症状が進むと

頭痛

嘔吐

倦怠感

判断力の低下

集中力の低下

虚脱感

2. 手当

STEP1 できるだけ早く 涼しい場所へ避難

- 風通しの良い日陰や、冷房が効いている室内に避難
- 厚い衣服は脱がせる

STEP2 できるだけ早く 体を冷やす!

- 首・脇・脚の付け根を冷やす
- 体（胸・腹の体表面）に水をかける
- 濡れたタオルで覆う、扇風機やうちわで風をあてる
- 手のひらや足の裏を冷やすことも有効

STEP3 水分と塩分補給

- 意識があり吐き気がない場合は、経口補水液、スポーツ飲料などを飲ませる

注意 次のような症状で手当の判断に迷う場合は、**直ちに119番通報を!**

- 水分が補給できない
- 症状に改善が見られない
- 呼びかけへの反応がおかしい
- 全身のけいれん

- 救急隊の到着前から**冷却を開始する**
- 反応（意識）がなく、普段どおりの呼吸がない場合
- 一次救命処置（心肺蘇生とAEDを用いた電気ショック）を行う**

(参考動画：心肺蘇生とAEDの使い方)

3. 事故予防

日常生活の工夫で熱中症を予防

- 涼しい環境を選ぶ：屋外では日陰、室内では扇風機やエアコンを活用
- 服装の工夫：通気性・吸汗・速乾素材の衣類や帽子を着用
- こまめな水分補給：喉が渇く前から水分を摂る
- 暑さに慣れる体づくり：日頃から汗をかく習慣を
- 体調管理：疲労・睡眠不足・持病・薬の影響にも注意
- 周囲との協力：集団生活ではお互いに配慮を
- 乳幼児の注意事項：ベビーカーは地面からの伝わる熱の影響を受けやすいので注意を
子どもを炎天下、自動車の中、暑い室内などに残さないように
- 高齢者の注意事項：高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくく、体温調節機能が低下している
周囲の人は「水分とってますか？」などの声かけを定期的に

4. まとめ

参考 傷病者の観察

熱中症も含め病気やケガの手当てには、現場と傷病者を詳しく観察する必要があります。

(観察の動画)

参考 搬送

涼しい場所への避難など、傷病者を動かす際は、正しい手順で搬送する必要があります。

(搬送の動画)

気候変動の影響に対し、私たちにできること

地球温暖化をもたらす気候変動は、人間のいのちと健康、尊厳を脅かす人道危機です。日本赤十字社茨城県支部と一緒に、環境と人道の未来を考え、行動してみませんか？

気候変動の情報発信中！